

ROSSOVIVO

vitalità sorprendente

VENTO DI PRIMAVERA

BORO ALTAMENTE CONCENTRATO
OTTIMIZZA FIORITURA ED ALLEGAGIONE
SUPPORTA LA DIVISIONE CELLULARE
FAVORISCE LA TRASLOCAZIONE DEGLI ZUCCHERI NEI FRUTTI

BOREA®



Confezione
da 1, 10, 200 L

Peso netto: 1 L - 1,35 kg



CONSENTITO IN
AGRICOLTURA
BIOLOGICA


KALÒS
CENTRO DI COMPETENZA
www.kalosgate.com



ROSSOVIVO
vitalità sorprendente

E-LABEL KALOS
LA SCHEDA DIGITALE DI
PRODOTTO MULTILINGUA



VENTO DI PRIMAVERA

Per ottenere una fioritura performante, è essenziale supportare la fisiologia della pianta e l'abbondante richiesta dei nutrienti. Il livello di micronutrienti influisce direttamente su numero e qualità dei fiori, e sulla resistenza delle piante a tutti gli stress. Tutto ciò condiziona l'allegagione.

BOREA è un CONCIME a base di Boro da boroetanolammina formulato grazie a RossoVivo: la più sofisticata tecnologia messa a punto da Kalos per esaltare la qualità dei nutrienti fogliari.



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

FOGLIARE

COLTURA	DOSAGGIO	PERIODO D'IMPIEGO
Anguria	0.5 l/ha	3 trattamenti a 15, 30 e 45 giorni dopo la germinazione
Brassicacee	3 l/ha	Allo stadio di 4-6 foglie, ripetere l'applicazione ogni 10-14 gg
Carota	3 l/ha	Allo stadio di 15 cm di altezza; in caso di carenza ripetere l'applicazione ogni 10-14 gg.
Cucurbitacee	2 l/ha	Allo stadio di 4-6 foglie; in caso di necessità ripetere l'applicazione ogni 10-14 gg.
Drupacee	2 l/ha	Applicati dopo la raccolta prima della caduta delle foglie
Fagiolo, Pisello	2 l/ha	Allo stadio di 10-15 cm; in caso di carenza ripetere l'applicazione ogni 10-14 gg.
Lattuga	1-2 l/ha	Da 10 a 20 giorni dopo il trapianto o l'emergenza
Melanzana	2 l/ha	Dallo stadio di 4-6 foglie in poi. Ripetere i trattamenti se necessario
Olivo	2-3 l/ha	in prefioritura
Patata	1-2 l/ha	7-14 giorni dopo la completa l'emergenza
Pomacee	1-2 l/ha	Applicati due volte prima della fioritura e una volta dopo la fioritura; 2 l/ha applicati dopo la raccolta prima della caduta delle foglie.
Spinacio	1 l/ha	Dallo stadio di 4-6 foglie. Ripetere ad intervalli di 10-14 gg se necessario.
Vite da vino	1-1.5 l/ha	Da prefioritura ad allegagione.
Altre colture	1-2 l/ha	

COLTURE PROTETTE

Massima concentrazione 0.1 l/hl. Volume d'acqua: 1000 l/ha massimo. Applicazione: fare riferimento alle indicazioni per il pieno campo.

AL TERRENO

Tutte le colture	3-5 l/ha	Applicare prima di seminare o di piantare o durante la dormienza delle colture perenni.
------------------	----------	---

COMPOSIZIONE

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI - BORO ETANOLAMMINA

Boro (B) solubile in acqua 11% INGREDIENTI: boro etanolammina

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA



BOREA®