

ROSSOVIVO

vitalità sorprendente


DRITTO AL CUORE DELLA FOTOSINTESI

MAGNESIO ALTAMENTE ASSIMILABILE

EQUILIBRA I RAPPORTI MG/K E MG/N

OTTIMIZZA IL METABOLISMO FOTOSINTETICO ED ENERGETICO

VERDERO®



Confezione da 5 L

Peso netto: 1 L - 1,44 kg



CONSENTITO IN
AGRICOLTURA
BIOLOGICA



KALÒS
CENTRO DI COMPETENZA

www.kalogsate.com



ROSSOVIVO
vitalità sorprendente

E-LABEL KALOS
LA SCHEDA DIGITALE DI
PRODOTTO MULTILINGUA



DRITTO AL CUORE DELLA FOTOSINTESI

Le prime fasi della crescita dei frutti sono le più importanti per il buon esito del raccolto ma spesso sono anche le più delicate. Il metabolismo energetico della pianta si deve equilibrare correttamente tra spinta produttiva e vegetativa; e tutti gli elementi devono essere nei giusti rapporti affinché la carenza, l'eccesso o molto più spesso un errato

rapporto tra di essi non diventi un fattore limitante.

VERDERO è un CONCIME a base di Magnesio formulato grazie a RossoVivo: la più sofisticata tecnologia messa a punto da Kalos per esaltare la qualità dei nutrienti fogliari.



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

FOGLIARE

COLTURA	DOSAGGIO	PERIODO D'IMPIEGO
Actinidia	2 - 4 l/ha	in prefioritura, durante lo sviluppo del frutto e dopo la raccolta prima della senescenza fogliare
Agrumi	2 - 4 l/ha	da pieno germogliamento. Ripetere l'applicazione 10-14 giorni più tardi
Albicocco, Nettare, Pesco	2 - 4 l/ha	all'allegagione. In casi di carenza, ripetere l'applicazione ad intervalli di 10-14 giorni
Cereali	2 - 4 l/ha	da inizio accestimento a fine spigatura
Ciliegio, Susino	2 - 4 l/ha	all'allegagione. In casi di carenza, ripetere l'applicazione ad intervalli di 10-14 giorni
Cucurbitacee	2 - 4 l/ha	allo stadio di 4-6 foglie. Ripetere l'applicazione 10-14 giorni più tardi
Fagiolo	2 - 4 l/ha	dalla prima trifogliata, ripetere ad intervalli di 10-14 giorni
Fragola	2 - 4 l/ha	al germogliamento, ripetere l'applicazione 10-14 giorni più tardi
Lattuga	2 - 4 l/ha	allo stadio di 4-6 foglie. Ripetere 10-14 giorni più tardi
Melanzana, Peperone, Pomodoro	2 - 4 l/ha	allo stadio di 4-6 foglie. Ripetere 10-14 giorni più tardi
Olivo	2 - 4 l/ha	da prefioritura. Ripetere 10-14 giorni più tardi
Patata	2 - 4 l/ha	1 settimana dopo la completa emergenza. Ripetere 10-14 giorni più tardi
Pomacee	2 - 4 l/ha	da prefioritura lungo tutto il ciclo vegetativo escluso la fioritura. In situazioni che inducono alla rugginosità (varietà, condizioni atmosferiche, ecc) ritardare le applicazioni fino a 6 settimane dopo la caduta dei petali
Vite	2 - 4 l/ha	a grappoli visibili, grappoli separati e allegagione
Altre colture	2 - 4 l/ha	

Per indicazioni più precise consultare la scheda digitale inquadrando il QR Code in alto a destra o sull'etichetta

COMPOSIZIONE

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI IN SOSPENSIONE

Ossido di magnesio (MgO) totale 33%

INGREDIENTI: carbonato di magnesio

AVVERTENZE: Il prodotto, se utilizzato vicino alla raccolta, può lasciare una patina bianca sul frutto.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA



VERDERO®